



SERIA
DLA PROFESJONALISTÓW

Florovit AGRO płynny nawóz dolistny MANGAN

Schelatowana postać manganu zapewnia pełną i szybką absorpcję tego mikroelementu przez liście. Skuteczny w szerokim zakresie pH od 4.0 do 9.0. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.



GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax 55 242 75 00



Florovit AGRO płynny nawóz dolistny MANGAN

NAWÓZ WE

Roztwór nawozowy manganu.

Skład nawozu: 3,0% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie. Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 4 – 12.

OBJAWY NIEDOBORU MANGANU

Objawem braku manganu jest chloroza. Pojawia się marmurkowatość - nawet małe nerwy liściowe są zielone, a przestrzenie pomiędzy nimi żółkną. Jest to podobny objaw jak w przypadku niedoboru magnezu z tym, że występuje najpierw na najmłodszych liściach. W burakach cukrowych zwłaszcza najmłodsze liście są chlorotyczne i pomarszczone. Na ziemniakach liście mają szare zabarwienie i pokrywają się drobnymi brunatnymi plamkami.

ZAKRES STOSOWANIA



UPRAWY SADOWNICZE

Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

Uprawa	Termin oprysku – faza rozwoju	Zalecana dawka nawozu l/ha	Ilość oprysków
Drzewa pestkowe	4-5 tyg. po kwitnieniu	4	2
	2 tyg. po zbiorze	4	1
Drzewa ziarnkowe	8 – 10 tyg. po kwitnieniu	4	2 (co 10 – 14 dni)
Maliny owocujące na pędach jednorocznych	Pierwsze liście początek kwitnienia	4	3 (co 7 – 10 dni)
Maliny owocujące na pędach dwuletnich	Pierwsze liście początek kwitnienia	4	3 (co 5 dni)
	Bezpośrednio po zbiorze	4	1
Truskawki, porzeczki i agrest	Bezpośrednio po zbiorze	4	1
Borówka wysoka	Pierwsze liście – początek kwitnienia	4	2 (co 10 – 14 dni)
	Opadanie płatków kwiatowych – zbiór owoców	4	1

UPRAWY WARZYWNICZE

Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 – 500 l/ha.

Uprawa	Termin oprysku – faza rozwoju	Zalecana dawka nawozu l/ha	Ilość oprysków
Warzywa kapustne, rośliny strączkowe	Objawy niedoboru	3	1 – 2
Burak ćwikłowy	4 – 6 tyg. od wschodów	6	2 (co 10 – 14 dni)
Cebula z siewu	4 – 6 liść	6	2 (co 10 – 14 dni)

UPRAWY ROLNICZE

Zalecana ilość cieczy roboczej – 200 – 300 l/ha.

Uprawa	Termin oprysku – faza rozwoju	Zalecana dawka nawozu l/ha	Ilość oprysków
Rzepak ozimy	Wiosną	3 – 8	2 (co 10 – 14 dni)
	Wiosenne ruszenie vegetacji	3	1
	Zwarty zielony pąk	3	1
Kukurydza	8 – 10 liść	3	1
	Przed wyrzucaniem wiech	4	1
Zboża	Jesienią: 2 – 3 liść	3	1
	Wiosną: strzelanie w źdźbło do fazy drugiego kolanka	4	1
Burak cukrowy	4 – 8 liść	5	2 – 3 (co 7 – 14 dni)



Zaleca się stosowanie nawozu zgodnie z Programami Nawożenia upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych, opracowanymi we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Programy nawożenia oraz tabele mieszań Florovitów AGRO oraz Florovitu AGRO ze Środkami Ochrony Roślin dostępne u Dystrybutorów oraz na: www.florovitagro.pl

tel: 22 711 59 56
M: 603 603 216
florovitagro@inco.pl