



SERIA
DLA PROFESJONALISTÓW

Florovit AGRO płynny nawóz dolistny ŻELAZOWO-MANGANOWY

Unikalne połączenie dwóch mikrośladników pokarmowych – żelaza i manganu. Formuła łatwo przyswajalna przez rośliny, zapewniająca szybkie i optymalne zaopatrzenie rośliny. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.



GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax 55 242 75 00

ŻELAZOWO- MANGANOWY (Fe + Mn)

Florovit AGRO płynny nawóz dolistny ŻELAZOWO-MANGANOWY



NAWÓZ WE

Płynna mieszanina mikrośladników pokarmowych żelazo (Fe), mangan (Mn).
Skład nawozu: 4,0% (Fe) żelazo rozpuszczalne w wodzie, 4,0% (Mn) mangan rozpuszczalny w wodzie.

OBJAWY NIEDOBORU ŻELAZA

Najbardziej charakterystyczny objaw niedoboru żelaza to chloroza objawiająca się tym, że młode liście początkowo stają się jasnozielone, następnie żółkną i bieleją. Nerwy liściowe i tkanka do nich przylegająca pozostają zielone. Chloroza rozpoczyna się od najmłodszych liści i stopniowo obejmuje liście starsze.

OBJAWY NIEDOBORU MANGANU

Objawem braku manganu jest chloroza. Pojawia się marmurkowatość - nawet małe nerwy liściowe są zielone, a przestrzenie pomiędzy nimi żółkną. Jest to podobny objaw jak w przypadku niedoboru magnezu z tym, że występuje najpierw na najmłodszych liściach. W burakach cukrowych zwłaszcza najmłodsze liście są chlorotyczne i pomarszczone. Na ziemniakach liście mają szare zabarwienie i pokrywają się drobnymi brunatnymi plamkami.

ZAKRES STOSOWANIA



sadownictwo



rolnictwo



warzywnictwo

UPRAWY ROLNICZE

Zalecana dawka nawozu – 2,5 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 l/ha.

Uprawa	Termin oprysku – faza rozwoju	Ilość oprysków
Uprawy rolnicze	Objawy niedoboru (chlorozy)	1 – 2

UPRAWY SADOWNICZE

Zalecana dawka nawozu – 2,5 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

Uprawa	Termin oprysku – faza rozwoju	Ilość oprysków
Drzewa pestkowe	4-15 tygodni po kwitnieniu	2
	2 tygodnie po zbiorze	1
Drzewa ziarnkowe	8 – 10 tygodni po kwitnieniu	2 (co 10 – 14 dni)
Maliny owocujące na pędach jednorocznych	Pojawianie się pierwszych liści – początek kwitnienia	3 (co 7 – 10 dni)
	Pierwsze liście – początek kwitnienia	3 (co 5 dni)
Maliny owocujące na pędach dwuletnich	Bezpośrednio po zbiorze	1
	Truskawki	Bezpośrednio po zbiorze
Porzeczki, agrest	Bezpośrednio po zbiorze	1
Borówka wysoka	Pierwsze liście – początek kwitnienia	2 (co 10 – 14 dni)
	Opadanie płatków kwiatowych – zbiór owoców	1

UPRAWY WARZYWNICZE

Zalecana dawka nawozu – 2,5 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 400 – 500 l/ha.

Uprawa	Termin oprysku – faza rozwoju	Ilość oprysków
Uprawy warzywnicze	Objawy niedoboru (chlorozy)	1 – 2

Zaleca się stosowanie nawozu zgodnie z Programami Nawożenia upraw sadowniczych, rolniczych i warzywniczych, opracowanymi we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Programy nawożenia oraz tabele mieszań Florovitów AGRO oraz Florovitu AGRO ze Środkami Ochrony Roślin dostępne u Dystrybutorów oraz na: www.florovitagro.pl

tel: 22 711 59 56
M: 603 603 216
florovitagro@inco.pl